



藥訊

Ten-Chan Medical group

健康、真愛、天成心

出版單位：藥劑科
聯絡電話：
4629292-22525

期別 No.10408

抗血小板藥物 Clopidogrel 藥品安全資訊

張欽喻藥師

壹、 背景

Clopidogrel 是一個前驅藥物，其經過肝臟代謝後產生活性代謝物，該活性代謝物會選擇性抑制 adenosine diphosphate(ADP)結合到血小板上 P2Y₁₂ 受體，如此便會抑制經由 ADP 媒介的 GPIIb/IIIa 複合體的活化作用，進而抑制血小板凝集。

Clopidogrel 的適應症包含可降低近期發生中風、心肌梗塞或週邊動脈血管疾病的粥狀動脈硬化病人之粥狀動脈栓塞事件的發生、與 aspirin 併用降低非 ST 段上升之急性冠心症病人之粥狀動脈栓塞事件、與 aspirin 併用可用於以內科治療的 ST 段上升之急性心肌梗塞病人、不適合接受 vitamin k antagonist 的心房纖維顫動患者，併有至少一個發生血管事件危險因子，且屬於出血危險性低者，可與 aspirin 併用以預防粥狀動脈栓塞及血栓栓塞事件，包含中風。

由於全國藥物不良反應通報中心近年接獲數件疑似因使用

clopidogrel 成分藥品引起的 SJS、TEN、DRESS 之案例，且部分嚴重個案後果為死亡，故有此藥物安全資訊。

貳、 藥物安全有關資訊分析及描述

雖然部分通報案例可能因同時使用其他藥品，或本身身體不佳而導致死亡，但有鑑於含 clopidogrel 成分藥品在國內廣泛應用，故提醒含 clopidogrel 成分藥品可能發生罕見但嚴重之皮膚不良反應(SJS/TEN/DRESS)，醫療人員應主動告知患者，若發生皮膚黏膜不適時，應立即停藥並回診處方醫師；經停藥症狀改善後，亦不可再重複投與含 clopidogrel 成分藥物，以避免發展至 SJS/TEN/DRESS 等嚴重皮膚不良反應。

參、 醫療人員應注意事項

使用含 clopidogrel 成分藥品可能發生罕見但嚴重之皮膚不良反應(SJS/TEN/DRESS)，初期可能有下列癥兆：喉嚨疼痛伴隨發燒情形、口腔/黏膜潰爛、皮膚紅疹、丘疹、廣泛性表皮脫落、眼睛癢、水泡、出血、黃疸、腹痛等，如及早發現並經適當處置，可避免或降低嚴重皮膚不良反應之風險及嚴重度。

如病人使用藥物後出現前述症狀時，應瞭解病人是否處方可疑藥物，切勿僅以為是上呼吸道或一般過敏症狀，並考慮是否為服用藥品後發生之不良反應，宜考慮立即停藥並採取適當處

置。

醫療人員應告知病人，使用含 clopidogrel 成分藥品可能發生皮膚黏膜相關不良反應，並提醒病人注意，如出現皮膚水疱紅疹或黏膜潰瘍等初期症狀時，應立即停藥並回診就醫；經停藥症狀改善後，亦不可再重複投予含 clopidogrel 成分藥品，以避免發展至 SJS/TEN/DRESS 等嚴重皮膚不良反應。

肆、 病人應注意事項

使用含 clopidogrel 成分藥品可能發生罕見但嚴重之皮膚不良反應/過敏反應，如用藥後發生喉痛、口腔/黏膜潰爛、皮疹等症狀，應考慮可能為藥品不良反應，宜立即就醫並考慮停藥。曾使用含 clopidogrel 或其他成分藥品而發生過敏相關不良反應者，請主動告知您的醫師。

資料載錄來源：TFDA_Clopidogrel 成分藥品安全資訊風險溝通表