



藥訊

Ten-Chan Medical group

健康、真愛、天成心

出版單位：藥劑科
聯絡電話：
4629292-22525

期別 No.10507

Aripiprazole 成分藥品安全資訊

張欽喻藥師

壹、 背景

Aripiprazole 為多巴胺 D₂ 和血清素 5-HT_{1A} 接受體的部分作用劑，也是血清素 5-HT_{2A} 接受體的拮抗劑，用來治療成人和青少年 (13 至 17 歲) 的思覺失調症、雙極性疾患之躁症發作及混合型發作、重鬱症之輔助治療及妥瑞氏症。由於 2016 年 5 月 3 日美國 FDA 發布含 aripiprazole 成分藥品可能導致新的衝動控制問題之安全性資訊，故有此藥品安全資訊。

貳、 藥物安全有關資訊分析及描述

1. 美國 FDA 從不良事件通報資料庫 (FAERS) 及醫學文獻中發現 184 件與使用含 aripiprazole 成分藥品相關之衝動控制問題的通報案例 (包含：病態性賭博 164 例、強迫性性行為 9 例、強迫性購物 4 例、強迫性暴食 3 例與多重衝動控制問題 4 例)，通報案例涵蓋成人及兒童，且大多數案例於服藥前並無強迫行為的病史。

2. 所有通報案例中，這些無法控制的衝動於降低劑量或停藥後幾天到幾周內皆會停止，部分案例於再次使用含 aripiprazole 成分後，又再次出現強迫行為。
3. 美國 FDA 將於含 aripiprazole 成分藥品仿單新增警語以充分反映上述風險。

參、 醫療人員應注意事項

1. 曾有使用含 aripiprazole 成分藥品發生嚴重衝動控制問題 (特別是病態性賭博) 之通報案例。通報案例中，這些無法控制的衝動於降低劑量或停藥後皆會停止。
2. 其他通報頻率較賭博低之無法控制的衝動，包括：強迫性性行為、強迫性消費或購物、強迫性暴食及其他強迫性的衝動。
3. 應提醒病人及其照顧者注意，使用含 aripiprazole 成分藥品可能出現無法控制的衝動。
4. 治療期間應特別詢問病人是否出現新增或加劇的衝動，並建議病人若治療期間出現新增或加劇的強迫性或衝動性行為，應立即告知醫療人員。
5. 若病人出現新增或加劇的強迫性或衝動性行為，應考慮降低劑量或停藥。

6. 應密切監測高風險族群病人，包括有以下病史或家族史者：強迫症、衝動控制障礙、雙極性疾患、衝動型人格、酗酒、藥物濫用，或其他成癮行為。

肆、 病人應注意事項

1. 曾有使用含 aripiprazole 成分藥品出現罕見但嚴重的衝動控制問題(如：病態性賭博、強迫性暴食、強迫性購物及強迫性性行為)之通報案例。若未意識到這些無法控制或過度的行為，可能導致患者和他人的傷害。通報案例中，這些無法控制的衝動於降低劑量或停藥後皆會停止。
2. 若您或家人於服藥期間出現新增或加劇的賭博衝動、性衝動、失控的消費行為、強迫性暴食或其他不尋常的衝動，應立即告知醫療人員，但切勿於諮詢醫療人員前自行停藥。

資料載錄來源：TFDA_Aripiprazole 成分藥品安全資訊風險溝通表