



# 藥訊

Ten-Chan Medical group

健康、真愛、天成心

出版單位：藥劑科  
聯絡電話：  
4629292-22525

期別 No.10508

## Sodium fusidate 成分藥品安全資訊

張欽喻藥師

### 壹、 背景

Fusidic acid 為類固醇類抗生素(steroidal antibiotic)，作用機轉為抑制細菌蛋白質合成，由於我國全國藥物不良反應中心接獲疑似使用含 sodium fusidate 成分藥品後發生肝膽疾病相關不良反應或橫紋肌溶解症之不良反應通報案例，故有此安全資訊。

### 貳、 藥物安全有關資訊分析及描述

1. 我國全國藥物不良反應中心接獲共 31 例使用含 sodium fusidate 成分藥品後發生肝膽疾病相關不良反應(包含：肝炎、高膽紅素血症、黃疸或肝功能指數上升等症狀)及 2 例使用含該成分藥品後發生橫紋肌溶解症之不良反應通報案例。
2. 上述案例中，部分個案原先即患有肝癌、肝纖維化或急性肝衰竭；部分個案服用 sodium fusidate 成分藥品之治療時程較長(用藥時間長達 1 個月至 1 年)，另有少數個案

同時併用具交互作用的藥品(如:warfarin 或同為 CYP3A4 受質的 amiodarone)、具潛在肝毒性的藥品(如 clindamycin 或 rifampin)、或禁忌藥品(如: statin 類)。

### 參、 醫療人員應注意事項

1. 含 sodium fusidate 成分藥品仿單刊載之用法用量為：「成人與超過 12 歲之兒童：每日三次，每次二粒。皮膚與軟組織感染：建議劑量為每日二次，每次一錠，症狀嚴重者，劑量可以加倍。」，平均療程為 7~14 天；治療骨髓炎或較嚴重感染時，可能需較高劑量或較長之治療時程。
2. 由於 fusidic acid 經由肝臟代謝，排泄途徑主要經由膽汁，因此對於肝功能不全、膽道不正常、同時使用其他經由相同排泄路徑的抗生素，如: lincomycin 及 rifampicin 之病人或急性肝衰竭高危險群者，應更謹慎評估使用含該成分藥品之風險效益、治療時程及使用劑量，應投予高劑量長期治療時，應提醒病人定期回診做肝功能檢查。
3. 含 sodium fusidate 成分藥品與 statin 類藥品併用可能會增加橫紋肌溶解症發生之風險，此交互作用已列為使用禁忌。
4. 含 sodium fusidate 成分藥品具引起肝膽疾病相關不良反

應及藥品交互作用之潛在風險，應避免併用具潛在交互作用的藥品，如：warfarin、CYP3A4 受質(如：itraconazole、amiodarone...等)或具潛在肝毒性的藥品(如：clindamycin、rifampin...等)。

#### **肆、 病人應注意事項**

1. Sodium fusidate 為類固醇抗生素，用於治療皮膚及軟組織等感染症。
2. 使用含 sodium fusidate 成分藥品前，若您有肝膽方面的問題，或正在使用其他藥品，請主動告知處方醫師。
3. 服藥期間如出現肝膽損傷相關症狀，如：皮膚變黃、食慾不佳、茶色尿或持續且不明原因的疲倦感，應儘速就醫，若有任何其他不適症狀，請諮詢醫療人員。

資料載錄來源：TFDA\_Sodium fusidate 成分藥品安全資訊風險溝通表