



# 藥訊

Ten-Chan Medical group

健康、真愛、天成心

出版單位：藥劑科  
聯絡電話：  
4629292-22525

期別 No.10708

## Clarithromycin 成份藥品安全資訊

張欽喻藥師

### 壹、 背景

Clarithromycin 為一抗生素，藉由與感受性細菌的 50S 核糖體次單位結合，及抑制蛋白質的合成來發揮其對抗細菌的作用，適應症為上、下呼吸道有感受性細菌所引起之感染症。可與 omeprazole 併用治療與幽門螺旋桿菌(H. PYLORI)有關之十二指腸潰瘍。

2018/5/9 瑞士醫藥管理局 (Swissmedic) 發布，合併使用 clarithromycin 和 domperidone 可能會導致 QT 區間延長之不良反應之安全性資訊，故發佈此藥物安全資訊。

### 貳、 藥品安全有關資訊分析及描述

Clarithromycin 為巨環類抗生素，廣泛用於各類好氧性、厭氧性、革蘭氏陽性與陰性菌引起之感染症；domperidone 為周邊多巴胺受體拮抗劑，用於治療噁心、消化不良及胃輕癱。

Clarithromycin 為強力肝臟酵素 CYP3A4 抑制劑，  
domperidone 為 CYP3A4 之受質，兩者併用會增加  
domperidone 之血中濃度，且因兩者皆會導致 QT 區間延長，  
併用時可能會引起致命性心律不整。

瑞士醫藥管理局評估此藥物交互作用後，決定將此風險加  
註於含 clarithromycin 成分藥品仿單之「禁忌症」、「警語及注  
意事項」及「交互作用」處。

### **參、 醫療人員應注意事項**

1. 不應同時處方 clarithromycin 及 domperidone，如確有用藥需求，應考慮其他替代藥品。
2. 不應處方含 clarithromycin 成分藥品於有 QT 延長或心室心律不整病史，包括 torsades de pointes（多型性心室心律不整）病史者。
3. 處方含 clarithromycin 成分藥品時，應確認病人是否正在使用其他經由 CYP3A 代謝之藥品，因 clarithromycin 為強力 CYP3A4 抑制劑，可能會導致經由 CYP3A 代謝藥品的血中濃度升高而增加發生不良反應的風險。
4. 應告知病人心律異常相關症狀與徵兆，並提醒病人服藥期間若出現任何心臟不適症狀（如心悸、胸痛、暈厥等），應儘速回診就醫。

### **肆、 病人應注意事項**

1. 就醫時，請主動告知醫療人員您是否患有心臟相關疾病及目前是否正在服用任何藥品。

2. 服藥期間若出現任何心臟不適症狀(如心悸、胸痛、暈厥等),  
應立即就醫。

資料載錄來源：TFDA\_Clarithromycin 成分藥品安全資訊風險溝通表