


藥品變更說明	新 廠	舊 廠
代碼：IUROK 商品名：UROKINASE FOR INJECTION, 60,000 IU 成份：Urokinase 劑量：60000iu/vial。 適應症：急性肺栓塞、急性冠狀動脈栓塞、清潔靜脈導管。		
異動原因	取代原"綠十字"血栓溶素注射劑	
藥品變更說明	新 廠	舊 廠
代碼：OPINA1 商品名：舒攀平膜衣錠50毫克 成份：Pinaverium 劑量：50mg/tab 適應症：胃、十二指腸潰瘍、過敏性結腸、結腸炎、膽管運動困難及「其他適應症」等。		
異動原因	取代原 Pinaverium 50mg/cap (Sucam)	
藥品變更說明	新 廠	舊 廠

代碼：OZINC  
 商品名：Zinco 鋅  
 康錠 78 毫克  
 成份：Zinc  
 gluconate  
 劑量：78mg/tab  
 適應症：鋅不足之  
 補充。



**異動原因**


取代原 Zinc gluconate 78mg/tab (Glu Zin)

**藥品變更說明**

**新 廠**

**舊 廠**

代碼：IPITA  
 商品名：Pipe&  
 Tazo Powder 帝斯  
 坦乾粉注射劑  
 成份：  
 Piperacillin/Tazo  
 bactam  
 劑量：4.5g/vial  
 適應症：對  
 Piperacillin 具有  
 感受性，以及對  
 Piperacillin 具抗  
 藥性，但對  
 Piperacillin /  
 Tazobactam 有感受  
 性之 B-lactamase  
 產生菌株所引起之  
 中至嚴重程度感  
 染。



**異動原因**

取代原 Tapimycin 4.5g/vial

**藥品變更說明**

**新 廠**

代碼：ODRINK  
 商品名：Drinklear powder 澄易見散劑  
 成份：Picosulfate sodium/  
 Magnesium oxide  
 Citric acid  
 /anhydrous 劑量：  
 10mg/3.5mg/12g  
 適應症：成人大腸鏡檢查前之清腸劑。



**異動原因**

新進藥品

**藥品變更說明**

**新 廠**

**舊 廠**

代碼：EFUTIS  
 商品名：FUTISONE CREAM 膚益舒乳膏 0.05%  
 成份：Fluticasone propionate  
 劑量：0.5gm/gm  
 5gm/Tub  
 適應症：緩解皮膚病之發炎以及搔癢症狀。如：溼疹，包括異位性、初期和盤狀溼疹；結節性癢疹；乾癬(不包括廣泛性板塊之乾癬)、神經性皮膚病，包括單純苔癬；扁平苔癬、脂漏性皮膚炎、接觸性過敏反應、圓盤狀紅斑性狼瘡、一



般性紅皮症全身性類固醇治療之輔助治療、螫刺症、汗疹(痲子)。

**異動原因** 取代原 Fluticasone propionate cream "十全" 全佳膚乳膏

**藥品變更說明** **新 廠** **舊 廠**


代碼：OSORT  
 商品名：Sortuss cough Liquid "晟德" 息咳液  
 成份：  
 (Dextromethorphan +Glyceryl+Ipecac)  
 劑量：120ml/bot。  
 適應症：鎮咳、祛痰。



**異動原因** 與原 Butmira 60ml;120ml/bot 並存

**藥品變更說明** **新 廠** **舊 廠**


代碼：EPERM  
 商品名：Miteout cream 疥淨 30 克  
 成份：Permethrin  
 劑量：5% w/w  
 30gm/tub  
 適應症：可用於治療疥瘡感染。



**異動原因** 原 Permethrin 5% W/W Cream "Sandoz" 百滅寧軟膏廠商停止專案進口，由 Miteout cream 疥淨 30 克取代

**藥品變更說明** **新 廠** **舊 廠**

代碼：IPACL1  
 商品名：Formoxol"  
 永信"伏摩素注射液  
 成份：Paclitaxel  
 劑量：  
 6mg/ml/;10ml/vial  
 適應症：晚期卵巢  
 癌、腋下淋巴轉移  
 之乳癌，作為接續  
 含杜薩魯比辛  
 (DOXORUBICIN) 在  
 內之輔助化學療  
 法、已使用合併療  
 法(除非有禁忌，  
 至少應包括使用  
 ANTHRACYCLINE 抗  
 癌藥)失敗的轉移  
 乳癌、非小細胞肺  
 癌、愛滋病相關卡  
 波西氏肉瘤之第二  
 線療法；與 C  
 ISPLATIN 併用，作  
 為晚期卵巢癌之第  
 一線療法。與  
 GEMCITABINE 併  
 用，可使用於曾經  
 使用過  
 ANTHRACYCLINE 之  
 局部復發且無法手  
 術切除或轉移性之  
 乳癌病患、與  
 HERCEPTI  
 N 併用時，用於治  
 療未接受過化學治  
 療之轉移性且乳癌  
 過度表現 HER-2 之  
 病人。



**異動原因**

原 Formoxol 6mg/ml/;5ml/vial 包莊容量更換, 改為 10ml/vial