



藥訊

Ten-Chan Medical group

出版單位：藥劑科

聯絡電話：

4629292-22525

健康、真愛、天成心

期別 No. 11406

Giga® Oral Suspension 40mg/mL, 120mL/Bot 介紹

游思蓓藥師

一、前言

在惡性腫瘤中，惡病質(Cachexia)十分普遍，大約一半的晚期癌症患者會出現惡病質症狀。

惡病質是一種高分解代謝狀態，被定義為在慢性發炎反應的背景下骨骼肌的加速損失，可發生在晚期癌症以及慢性感染、愛滋病、心臟衰竭、類風濕性關節炎和慢性阻塞性肺病等等。雖然食慾不振和體重下降在癌症患者中很常見，但惡病質患者體重大幅下降不能完全歸咎於熱量攝取不足。口服攝取不足加上複雜的代謝異常，導致基礎能量消耗增加，最終骨骼肌萎縮、體重下降。與簡單的飢餓（其特徵是熱量缺乏，可以透過適當的餵食來逆轉）不同，惡病質導致的體重減輕無法透過積極餵食得到充分治療。

二、藥物機轉

Megestrol acetate 是一種合成黃體素，具有抗雌激素特性，可破壞雌激素受體循環。Megestrol acetate 會干擾正常的雌激素循環，是一種抗腫瘤孕激素，被認為透過腦下垂體介導的抗黃體化發揮作用，可被用於治療乳癌或子宮內膜癌。可能透過拮抗分解代謝細胞激素的代謝作用來刺激食慾。

三、劑型與含量規格

Giga® Oral Suspension 一罐為 120ml，每 ml 含 Megestrol acetate 40mg。

四、適應症

後天免疫缺乏症候群患者的厭食症、惡病體質或原因不明的體重明顯減輕。

五、用法用量

- 成人建議起始劑量：每日 400~800 毫克
- 使用前應將容器震搖均勻。

六、副作用

- 不良反應：腹瀉、性無能、紅疹、無力、疼痛等、腎上腺功能不全、靜脈血栓栓塞症。

七、注意事項

1. 不適用於預防體重減輕。
2. 有血栓性栓塞疾病病史的患者，應謹慎使用。
3. 糖尿病患服本藥期間，應密切留意血糖變化。若血糖控制不理想，應請教醫師。
4. 長期使用使用可能提高呼吸道感染的危險性
5. 接受本劑治療期間應停止授乳。
6. 懷孕用藥級數為 X 級，服藥期間懷孕請告知醫生。

八、儲存方式及使用注意事項

使用後請密封避光儲存於 25°C 以下。

九、參考資料

Uptodate

藥品仿單